

Deze lijst heeft betrekking op het tredmolen onderzoek

48 uur (2 dagen) voor het onderzoek stoppen met:

Roflumilast (Daxas)
Umeclidinium (Incruse Ellipta)
Indacaterol (Onbrez, Hirobriz)
Theofylline (Theolair Retard)
Glycopyrronium (Seebri, Tovanor)
Tiotropium (Spiriva, Tiotrus)
Olodaterol (Striverdi)
Indacaterol/Glycopyrronium (Ultibro, Xoterna)
Fluticasonfuroaat/vilanterol (Relvar Ellipta)
Umeclidinium/vilanterol (Anoro)
Tiotropium/Olodaterol (Spiolto)
Indacaterol/mometason (Aectura)
Glycopyrronium/Formoterol (Bevespi)
Indacaterol/glycopyrronium/mometason (Enerzair)
Beclometason/formoterol/glycopyrronium (Trimbow)
Fluticason/umeclidinium/vilanterol (Trelegy Ellipta)
Formoterol/glycopyrronium/budesonide (Trixeo)

24 uur (1 dag) voor het onderzoek stoppen met:

Salmeterol (Serevent)
Formoterol (Foradil, Atimos, Oxis)
Aclidinium (Elklira Genuair, Bretaris Genuair)
Montelukast (Singulair)
Formoterol+Beclometason (Foster)
Aclidinium+Formoterol (Duaklir Genuair)
Salmeterol+Fluticason (Seretide, Elpenhaler, AirFluSal
Fospiro, Salflutin, Salfuler)
Formoterol+Budesonide (DuoResp, Symbicort, Bufoler)
Formoterol+Fluticason (Flutiform)
Formoterol+Budesonide (Symbicort)

12 uur voor het onderzoek stoppen met:

Terbutaline (Bricanyl)
Fenoterol+Ipratropium (Berodual)
Salbutamol+Ipratropium (Combivent, Ipramol)

8 uur voor het onderzoek stoppen met:

Salbutamol (Airomir, Ventolin, Salbutamol)
Ipratropium (Atrovent, Ipraxa)

Het is niet nodig te stoppen met:

Ciclesonide (Alvesco)

Beclomethason (Qvar)

Budesonide (Pulmicort)

Fluticason (Flixotide)