

## Geneesmiddelen

### Gegevens patiënt

Naam: \_\_\_\_\_ Pin.nr. (intern): \_\_\_\_\_  
Geb.datum: \_\_\_\_\_ BSN (extern): \_\_\_\_\_  
Adres: \_\_\_\_\_ Geslacht: M / V  
Postcode/Plaats: \_\_\_\_\_

### Gegevens aanvrager

Naam aanvrager (arts): \_\_\_\_\_ Afdeling: \_\_\_\_\_  
Naam ziekenhuis: \_\_\_\_\_ Telefoonnr/sein: \_\_\_\_\_  
Adres: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_  
Postcode/Plaats: \_\_\_\_\_ Projectnr.: \_\_\_\_\_

### Toelichting bij de aanvraag / co-medicatie

---

---

---

---

---

---

---

---

### Gegevens te bepalen geneesmiddel(en)

Preparaat	Dosering	i.v./oraal	Sinds	Tijdstip en datum laatste toediening
_____	_____ d.d. _____ mg	_____	_____	_____ : _____ op _____ / _____ / 20 _____
_____	_____ d.d. _____ mg	_____	_____	_____ : _____ op _____ / _____ / 20 _____

### Antibiotica

p4/k4

- Amikacine dal p4
- Amikacine top p4
- Ceftazidim k4
- Ciprofloxacine k4
- Co-trimoxazol (sulfamethoxazol/trimethoprim) k4
- Doxycycline (Gekoeld aanleveren) k4
- Flucloxacilline k4
- Flucloxacilline vrije concentratie k4
- Gentamicine dal p4
- Gentamicine top p4
- Piperacilline k4
- Tobramycine dal p4
- Tobramycine top p4
- Trimethoprim k4
- Vancomycine dal p4
- Vancomycine top p4
- Vancomycine continu p4
- \_\_\_\_\_

### Anti-epileptica

p4

- Carbamazepine
- Fenobarbital
- Fenytoïne
- Valproïnezuur
- \_\_\_\_\_

### Antimycotica

p4

- Flucanazol
- Flucytosine dal
- Flucytosine top
- Isavuconazol
- Itraconazol
- Posaconazol
- Teicoplanine
- Voriconazol
- \_\_\_\_\_

### Tijdstippen bloedafname en start infuus altijd vermelden!

- Dosering: \_\_\_\_\_ mg
- Interval: \_\_\_\_\_ uur
- Tijdstip start infuus: \_\_\_\_\_ uur
- Bloedafname: dal: \_\_\_\_\_ uur
- top: \_\_\_\_\_ uur
- anders: \_\_\_\_\_ uur

### Antiretrovirale middelen

k4

- Abacavir
- Atazanavir
- Bictegravir
- Cabotegravir+Rilpivirine (Beschermd tegen licht)
- Darunavir
- Dolutegravir (Gekoeld aanleveren)
- Dolutegravir vrije conc. (Gekoeld aanleveren)
- Doravirine
- Efavirenz
- Elvitegravir
- Emtricitabine
- Etravirine
- Lamivudine
- Lopinavir
- Nevirapine
- Raltegravir
- Saquinavir
- Tenofovir (TDF)
- Tenofovir (TAF)
- \_\_\_\_\_

### Immunosuppressiva

k4

- Mycophenolzuur
- \_\_\_\_\_

### Diversen

p4/g4 [\$]

- Coffeïne
- Digoxine
- Eculizumab
- Lithium gs4
- Theofylline
- Thiopental/Pentobarbital
- \_\_\_\_\_

### DIT BLOK ALTIJD INVULLEN

#### Afnamegegevens

Afnamedatum: \_\_\_\_\_  
Afnametijd: \_\_\_\_\_  
Gewicht patient: \_\_\_\_\_ kg

#### Reden van aanvraag

- Controle, klinisch goed ingesteld
- Vermoeden van therapie-ontrouw
- Vermoeden van subtherapie
- Vermoeden van overdosering
- Vermoeden van intoxicatie
- Vermoeden van interactie met \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

CITO alleen i.o.m. apotheker via (024) 361 41 63

**Codes afnamematerialen z.o.z.**

### Antivirale middelen

k4/p4

- Aciclovir p4
- Ganciclovir p4
- Ribavirine k4
- \_\_\_\_\_

### Oncolytica

k4

- Abiraterone (aanleveren op ijs)\*
- Cabozantinib
- Cobimetinib
- Enzalutamide
- Imatinib
- Lenvatinib
- Methotrexaat T = \_\_\_\_\_ uur (p4) altijd aanmelden!
- Niraparib
- Olaparib
- Pazopanib
- Regorafenib
- Sorafinib
- Sunitinib + desethylsunitinib
- Vemurafenib
- \_\_\_\_\_

### Tuberculose-middelen

p4 [#]

**Afnemen of op 2 uur of op 2, 4 en 6 uur na toedienen (farmacokinetische curve, z.o.z.)**

- Azitromycine
- Bedaquiline
- Claritromycine
- Clofazamine
- Ethambutol
- Isoniazide
- Levofloxacine
- Linezolid
- Moxifloxacine
- Pyrazinamide
- Rifampicine
- \_\_\_\_\_

**[ # ] Opmerking: op droogijs aanleveren**  
**[ \$ ] overleg met apotheker over transport condities**

