


## Proefpersoneninformatie voor patiënten <12 jaar

Turner  Fertility

Onderzoek naar het invriezen van eierstokweefsel bij meisjes met het syndroom van Turner


# Wel of niet je eierstok invriezen?

Wat zie jij hier?




# Turner Fertility

Voor elke baby heb je een zaadje van de papa en een eitje van de mama nodig.




Elk meisje wordt met een voorraad eitjes geboren waarmee zij kindjes kan krijgen. De eitjes worden bewaard in jouw eierstokken. Jij hebt in jouw buik 2 eierstokken.



## Turner Fertility


Als je ouder wordt, zullen de eitjes steeds minder worden totdat ze op een gegeven moment 'op' zijn. Bij meisjes met het syndroom van Turner verdwijnen de eitjes veel sneller. Hierdoor kunnen de eitjes al op zijn voordat jij groot bent geworden. Als de eitjes op zijn, kan je geen eigen baby krijgen.




Helaas kunnen de dokters niet zien hoeveel eitjes jij nog hebt en of jij later hiermee een eigen baby kan maken.



Er zullen maar een paar meisjes met Turner syndroom zijn die later als zij groot zijn nog eitjes in hun buik hebben. Deze meisjes kunnen een baby uit hun eigen buik krijgen.




Als jouw eitjes op zijn, kun jij toch nog mama worden. Zo kun je een baby'tje krijgen via een eitje van een andere vrouw. Het kindje zal dan lijken op de mama van het eitje en de papa van het zaadje.







Ook kun je voor een kindje van een andere mama en papa zorgen. Dit wordt ook wel pleegzorg genoemd. Als pleegmama zorg jij dan samen met de buikpapa- en mama voor het kindje.



Soms kunnen de mama en een papa helemaal niet meer voor hun kindje zorgen. Het kindje krijgt dan een andere papa en mama die wel voor het kindje kunnen zorgen. (soms zelfs in een ander land). Dit wordt ook wel adoptie genoemd.



We kunnen ook proberen of we jouw eitjes kunnen bewaren voor later. Bijvoorbeeld door jouw eierstok met hierin de eitjes in te vriezen.



Een van jouw eierstokken wordt dan met een operatie uit jouw buik gehaald. Jij wordt in slaap gebracht zodat je geen pijn voelt.



Als jij weer wakker wordt, heb jij 3 pleisters op jouw buik: eentje bij je navel en twee pleisters op je buik. Onder de pleisters zitten 3 kleine wondjes die vanzelf weer dichtgroeien. Dit doet geen pijn. Als alles goed gaat, mag jij weer naar huis.

